

¿Qué podemos hacer?

¡Tomar medidas de bioseguridad!

10 acciones de bioseguridad que se deben tomar para evitar que R4T ingrese a su finca

1. Zonificación

Para restringir el movimiento de entrada y salida de la finca, se deben crear tres zonas. Esto evita el movimiento en el campo sin cumplir o respetar las medidas de bioseguridad (como cambio de botas, pediluvios, desinfección de herramientas), lo cual, reduce la posibilidad de que las esporas del hongo lleguen a zonas sanas.

1) Zona de Exclusión En la entrada de la finca (con espacio para que los vehículos se estacionen / giren)

2) Zona de Separación Generalmente consiste en la entrada a la finca, la oficina y la empacadora (excepto el Patio de fruta).

3) Zona de Producción Área de campo y patio de fruta.

2. Control de Entrada de Visitantes

El cuestionario para visitantes debe preguntar a las visitas si han estado en un país afectado por R4T en los últimos tres meses.

En caso afirmativo, se recomienda que el acceso de los visitantes en la finca esté restringido o que se apliquen medidas de bioseguridad extremas.

3. Restringir la Entrada de Vehículos

En la **Zona de Exclusión**, hágase la pregunta: ¿es necesario que el vehículo entre en la finca?

Los vehículos ajenos a la operación de las fincas deben estacionarse en la **Zona de Exclusión**.

4. Colocar Pediluvios

Se necesitan agua limpia y cepillos para limpiar botas, y pediluvio con desinfección

Ubicaciones: En el área de contacto entre la **Zona de Exclusión** y la **Zona de Separación**. También entre la **Zona de Separación** y la **Zona de Producción**.

Diseño del Pediluvio: dos pasos de longitud, con barreras laterales (para garantizar que siempre se use el pediluvio), y letreros.

Nota: La desinfección sólo es efectiva en botas limpias.

5. Lavado y Rodoluvio de Vehículos

Si un vehículo debe entrar en la **Zona de Separación**: ¡Desinfectélo!

Si un vehículo debe entrar / salir de la **Zona de Producción**, **deberá limpiarse y desinfectarse por completo**. Este es un movimiento de alto riesgo y debe evitarse a menos que sea absolutamente necesario.

6. Cambiar Botas

Calzado personal **nunca** debe usarse en la finca.

Se debe configurar un área de cambio de botas en la **Zona de Exclusión** de la finca, donde los trabajadores y visitantes deben cambiar sus zapatos personales por las botas de la finca.

Sugerencia: Utilizar botas de diferentes colores para la **Zona de Separación** y la **Zona de Producción**.

7. Desinfección de Herramientas

Configure las estaciones de desinfección de herramientas y asegúrese de que se utilizan.

Las herramientas de campo (**Zona de Producción**) no deben mezclarse con las de la **Zona de Separación**.


Ninguna herramienta debe salir de la finca.

8. Barreras alrededor de la Finca

Las barreras en la **Zona de Exclusión** son vitales para evitar que los vehículos y las personas entren sin cumplir o respetar las acciones de bioseguridad requeridas.

Cercas, barreras vegetales y / o zanjas son algunas opciones para que las barreras del perímetro de la finca prevengan el ingreso y aseguren que se respetan las medidas de bioseguridad de la finca.

Es muy importante tener una barrera entre la **Zona de Separación** y la **Zona de Producción** para mantenerlos separados.



9. Monitorear fuentes de Agua

¿De dónde está extrayendo el agua?

El agua de pozo y las fuentes de agua públicas tienen menos probabilidades de estar contaminadas que el agua de ríos y arroyos.

10. Material de Siembra

¡¡Sólo obtenga su material de siembra de fuentes confiables y certificadas!!

Para tener en cuenta:

- Amarilleo de los bordes de las hojas más viejas
- Hojas marchitas que se doblan creando una falda alrededor del pseudotallo
- Pseudotallo partido en la base (pero no siempre)
- Tejido vascular marrón oscuro en el cormo y el pseudotallo



★ Sensibilice a los trabajadores.

★ Colabore con las autoridades nacionales y locales.

Si ve síntomas sospechosos en una planta, por favor notifique a:

- **Representante del Ministerio de Agricultura**
- **El Departamento de Inocuidad y Cumplimiento de Fyffes (+506) 83096960**
- **Autoridad Nacional de Salud y Protección Vegetal**

Nota: No corte la planta sospechosa hasta que las autoridades lo permitan.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Eimear Lynch en elynch@fyffes.com

Para más información visite: <http://www.fao.org/world-banana-forum/disease/tr4-global-network>



Acerca de R4T

¿Qué es R4T? Es un hongo transmitido a través del suelo.

Nombre común: R4T, o Mal de Panamá
Nombre científico: *Fusarium oxysporum f. sp. Cubense*, Raza 4 Tropical
Afecta: Banano Cavendish

¿Cómo afecta a la planta?

Las esporas germinan y penetran sus hifas en las raíces de las plantas. El hongo luego bloquea el tejido vascular que transporta agua y nutrientes, provocando marchitez.

¿Cómo se propaga?

Las esporas se pueden propagar a través del suelo, el agua y el material de plantación. Las esporas pueden sobrevivir hasta 30 años, incluso sin presencia de cultivo de banano.

GlobalGAP R4T Biosecurity Add-On

Todos los proveedores de Fyffes deben incluir el complemento **TR4-Biosecurity Add-On** para **Bananos** en su próxima auditoría GlobalG.A.P.

Esta es una evaluación, y no afecta el puntaje de la auditoría, pero proporcionará orientación sobre dónde la finca puede mejorar sus medidas de bioseguridad.

Al aplicar estas medidas de bioseguridad, usted está ayudando a proteger no sólo su propia finca, sino también la industria bananera del país.

